

CONDUITE A TENIR EN CAS DE FAUSSE ROUTE

A) EVOQUER UNE FAUSSE ROUTE Pendant ou après le repas SI ...



AGITATION



LEVRES FACE BLEUE YEUX ROUGES



COU VIOLECE



PERTE DE CONNAISSANCE

>>>> **B) APPELER DE L'AIDE**

C) EVALUER CONSCIENCE / TOUX / RESPIRATION



D) AGIR

CONSCIENCE Normale	TOUX Possible	RESPIRATION Possible	CONSCIENCE Normale	TOUX Possible	RESPIRATION Possible	CONSCIENCE Inconscience	TOUX Impossible	RESPIRATION Impossible
<ul style="list-style-type: none"> - Ne pas mobiliser - Rassurer - Encourager à tousser - Présence jusqu'à expulsion corps étrangers ? 			<p>Ouvrir la bouche :</p> <p>1 > Si corps étranger visible : Extraction au doigt, ou tout autre moyen (pince Magill (!))</p> <p>2 > Si corps étranger non visible : 5 claques dans le dos et si inefficace ; 5 manœuvres de Hemlich</p> <p>3 > Si Hemlich inefficace : 5 manœuvres de la table.</p> <p>>>> Si inefficace ou irréalisable si réalisables :</p> <p>Si inefficace</p> <ul style="list-style-type: none"> -si conscient : recommencer 1, 2 et 3 -si inconscient : 4, 5, 6, 7 			<p>4 > Faire appeler le 15 ou le 112 (portable) et</p> <p>5 > Faire chercher un défibrillateur Automatique externe (le mettre en fonction dès que possible) et</p> <p>6 > un insufflateur manuel et</p> <p>7 > débiter immédiatement la réanimation cardio pulmonaire.</p> <p>>>>> Alterner :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 compressions thoraciques (fréquence 100 par minute) et - 2 insufflations avec insufflateur manuel (ou bouche à bouche) 		

1- Ouvrir la bouche :



si corps étranger visible, retirer au doigt ou à la **pince de Magill** : attention de ne pas le pousser +++

Pince de Magill



2- manœuvres de Heimlich :



1. Se tenir derrière la victime
2. Mettre son poing droit sous son sternum en regard de l'estomac
3. Recouvrir son poing droit avec sa main gauche en enlaçant totalement le patient
4. Pencher la victime en avant
5. Imposer des pressions brusques en arrière et vers le haut.

3- manœuvre de la table



En l'absence d'efficacité ou en cas d'impossibilité de réaliser la manœuvre de Heimlich (obésité) :


- 1. **Allonger** la victime à plat ventre sur une table, ses bras et sa tête pendant
- 2. Lui donner des **claques dans le dos** entre les deux omoplates avec la paume de sa main
- Ouvrir la bouche pour **extraire corps étranger**

Alterner Heimlich et manœuvre de la table jusqu'à extraction du corps étranger.

4- Faire appeler le 15 :



5- Défibrillateur :




6-Compressions thoraciques :

Compressions thoraciques

- Victime sur le dos
- S'agenouiller sur le côté de la victime
- Placer la paume de sa main au milieu de la poitrine
- Placer la paume de l'autre main sur la première
- Les bras droits, se placer verticalement au dessus de la victime
- Déprimer le sternum de 5 cm.

7-Insufflation :



Avec insufflateur manuel, appliquer le masque et soulever le menton de la victime

Si bouche-à-bouche : Main gauche placée sur le front; obstruer le nez avec le pouce et index en maintenant la tête de la victime en arrière ... ET Insuffler progressivement en deux secondes pour que la poitrine de la victime se soulève.